



Overdracht

S	Anamnese	Lichamelijk onderzoek A B  O ₂ (%):  (/min): C  (/min):  (mmHg): D  (mmol/L):  : E/M/V: E  (°C):
	Ingezet beleid	
B	Voorgeschiedenis	Medicatie
	Allergieën	Behandelbeperkingen Reanimeren: ja/nee
A	Vitaal bedreigd in A / B / C / D / E	Werkdiagnose
R	Beleidsadvies	Verwezen naar ziekenhuis + afdeling

Overdracht (z.o.z.)

Wacht u op de ambulance en verslechtert of verandert de situatie? Neem dan met spoed opnieuw contact op met de huisarts of bel 112.

INDICATIE VAN NORMAALWAARDEN

Leeftijd	Gewicht (kg)		Ademhaling per min.	Hartfrequentie per min.	Bloeddruk systolisch (minimaal)
	M	V			
Geboorte	3,5	3,5	25-50	120-170	65-75
1 mnd	4,5	4,5			
3 mnd	6,5	6	25-45	115-160	
6 mnd	8	7	20-40	110-160	
12 mnd	9,5	9			70-75
18 mnd	11	10	20-35	100-155	
2 jaar	12	12	20-30	100-150	70-80
3 jaar	14	14		90-140	
4 jaar	16	16		80-135	
5 jaar	18	18			80-90
6 jaar	21	20		80-130	
7 jaar	23	22			
8 jaar	25	25	15-25	70-120	
9 jaar	28	28			
10 jaar	31	32			
11 jaar	35	35			
12 jaar	43	43	12-24	65-115	90-105
14 jaar	50	50		50-110	
Volw.	70	70		55-80	

Bron: APLS compact BSL 2019 Turner en Nusmeier

NEW GLASGOW COMA SCALE/EMV-SCORE

Ogen openen (E)	Score
Spontaan	4
Op geluid	3
Op een drukprikkel	2
Afwezig	1
Niet testbaar	NT
Motorische reactie (M) (in geval van lateralisatie telt de beste score)	Score
Voert een tweeledige opdracht uit	6
Lokaliseert (komt boven clavicula na pijnprikkel supra-orbitaal)	5
Normale buigreactie*	4
Abnormale buigreactie**	3
Strekreactie	2
Afwezig	1
Niet testbaar	NT
Verbale reactie (V)	Score
Georiënteerd/helder gesprek	5
Verward/zinnen	4
Woorden/inadequaaf	3
Geluiden/onverstaanbaar	2
Afwezig	1
Niet testbaar	NT

* **Normale buigreactie:** snel, wisselend van aard, arm beweegt weg van het lichaam

** **Abnormale buigreactie:** traag, arm beweegt richting de borst, onderarm roteert, gebalde vuisten, strekreactie in de benen